Sklice®
(ivermectin)
Lotion, 0.5%

LA MARCA RECETADA N.º 1 CONTRA LOS PIOJOS DE LA CABEZA[1]

NO SE DESESPERE
LA LOCIÓN SKLICE MATA LOS PIOJOS

La loción Sklice es un medicamento recetado para uso tópico en el cabello y el cuero cabelludo solamente, para el tratamiento de los piojos de la cabeza en personas a partir de los 6 meses de vida.

La loción Sklice debe usarse en el contexto de un programa integral de manejo de los piojos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LA LOCIÓN SKLICE

Los efectos secundarios más frecuentes de la loción Sklice incluyen dolor o enrojecimiento ocular, irritación ocular, caspa, piel seca y sensación de ardor en la piel.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las siguientes páginas y la Información de Prescripción completa adjunta que se encuentra en la solapa posterior.

Para obtener más información, visite **www.Sklice.com**.

arbor
PHARMACEUTICALS, LLC

Sklice® (ivermectin) Lotion, 0.5%

SI PIENSA QUE SU HIJO TIENE PIOJOS DE LA CABEZA, CONSULTE A SU MÉDICO SI PUEDE RECETARLE LA LOCIÓN SKLICE HOY MISMO

Los piojos de la cabeza son visitantes indeseados que pueden revolucionar todo su hogar. Converse con su proveedor de atención médica sobre cómo la loción recetada Sklice trata los piojos de la cabeza en solo 10 minutos, ¡sin necesidad de peinar las liendres![2] La loción Sklice está aprobada por la FDA como tratamiento de 10 minutos para los piojos de la cabeza que puede usarse en las personas a partir de los 6 meses de vida.[2,3] Sin embargo, el tratamiento es solamente un paso en el proceso de librarse de los piojos de la cabeza. A continuación, puede conocer más detalles sobre la loción Sklice y encontrar consejos útiles que pueden ayudarlo a detener el contagio de los piojos.

La loción Sklice debe usarse en el contexto de un programa integral de manejo de los piojos:

- Pida a su hijo que no comparta peines, cepillos, gorros, bufandas, bandanas, vinchas, cintas, hebillas ni toallas; básicamente nada que se ponga o se use en la cabeza.[4]
- Si hay una infestación de piojos de la cabeza en la escuela de su hijo, se recomienda suspender las pijamadas por un tiempo. Esto ayudará a evitar el contacto cabeza con cabeza con otros niños que tengan piojos.[4]

Se puede usar un peine de dientes finos o un peine especial para liendres para retirar los piojos muertos y las liendres.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) de los EE. UU.

LA LOCIÓN SKLICE MATA LOS PIOJOS

En 2 estudios clínicos,* la loción Sklice resolvió el problema de los piojos de la cabeza para la mayoría de los pacientes† con la aplicación de 1 tubo y sin peinar las liendres.[2]

*Dos ensayos aleatorizados, a doble ciego, controlados con vehículo en participantes a partir de los 6 meses de vida con infestaciones de piojos de la cabeza. La eficacia primaria se evaluó como la proporción de participantes que no tenían piojos vivos en el día 2 y desde el día 8 hasta la evaluación final 14 (+2) días después de una sola aplicación.

†Catorce días después del tratamiento, no se observaron piojos vivos en el 76.1 % (54/71) y 71.4 % (50/70) de los participantes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LA LOCIÓN SKLICE

Los efectos secundarios más frecuentes de la loción Sklice incluyen dolor o enrojecimiento ocular, irritación ocular, caspa, piel seca y sensación de ardor en la piel.

Para prevenir la ingesta accidental, se requiere la supervisión de un adulto para la aplicación pediátrica. Evite el contacto con los ojos.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las siguientes páginas y la Información de Prescripción completa que se encuentra en la solapa posterior.

Sklice® (ivermectin) Lotion, 0.5%

CÓMO APLICAR LA LOCIÓN SKLICE

No olvide consultar a su médico, enfermero o farmacéutico si tiene preguntas sobre la forma correcta de aplicar la loción Sklice.

SIGA LOS PASOS[2]

PASO 1

El cabello y el cuero cabelludo deben estar secos antes de aplicar la loción Sklice. Use la parte superior de la tapa para romper el precinto de seguridad del tubo.

PASO 2

Cubra completamente el cuero cabelludo y el cabello más cercano al cuero cabelludo primero, luego aplique hacia afuera, hacia las puntas del cabello y frote la loción Sklice por todo el cabello. Asegúrese de que todo el cabello esté cubierto desde el cuero cabelludo hasta la punta, para que todos los piojos y las liendres estén expuestos a la loción. Use hasta un tubo entero por completo. Deje el producto en el cabello y el cuero cabelludo durante 10 minutos.

PASO 3

Después de 10 minutos, enjuague completamente la loción Sklice del cabello y el cuero cabelludo usando solo agua. Usted o cualquiera que lo ayude a aplicar la loción Sklice debe lavarse las manos después de la aplicación. No use la loción Sklice otra vez sin consultar primero a su proveedor de atención médica.

- **Solo para uso tópico. No ingerir. La loción Sklice no es para uso oral, oftálmico ni intravaginal.[2]**
- **El tubo está previsto para un solo uso; deseche cualquier porción no utilizada.[2]**
- **La loción Sklice debe usarse en el contexto de un programa integral de manejo de los piojos.[2]**

5 PASOS PARA TRATAR LOS PIOJOS DE LA CABEZA EN SU HOGAR

Al igual que cualquier padre que tiene que lidiar con los piojos de la cabeza por primera vez, es posible que tenga algunas preguntas. Esta lista de verificación lo ayudará a empezar.

PASO 1

Revise a todos los miembros de la familia para saber si tienen piojos o liendres. Considere la posibilidad de llamar al médico de inmediato para hacer una cita y obtener asesoramiento y orientación sobre el tratamiento. Si sospecha que algún miembro de la familia tiene piojos, es buena idea llevarlo al médico también.

PASO 2

Consulte con su médico. Pregunte por las opciones de tratamiento. Retire el medicamento recetado de la farmacia. Asegúrese de comprender exactamente cómo usar el medicamento antes de irse de la farmacia.

PASO 3

Elimine los piojos de su casa. Identifique los elementos que pueden contener piojos de la cabeza, como almohadas/ropa de cama, peluches, gorros, bufandas, cascos, ropa. Lave a máquina todos los elementos que sean lavables con agua caliente (130 °F).[4,6] Selle los elementos que no se pueden lavar en bolsas de plástico durante 2 semanas.[4]

PASO 4

Comparta la información. Llame a los padres de los niños que puedan haber estado en contacto cercano con el suyo.[4] Cancele todas las pijamadas y días de juego hasta que esté seguro de que su hijo no tiene piojos.[2] Avise a la escuela de su hijo.[4]

PASO 5

No se desespere. Respire hondo. Tranquilice a su hijo y dígale que esto es normal. Ayude a su hijo a entender que no es su culpa. Cualquiera puede tener piojos, sin importar cuán limpio está su cabello o su casa ni dónde vive, va a la escuela o juega.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las siguientes páginas y la Información de Prescripción completa que se encuentra en la solapa posterior.

Sklice® (ivermectin) Lotion, 0.5%

CONCÉNTRESE EN LOS HECHOS, NO EN MITOS

- Los piojos de la cabeza son insectos de color gris blancuzco, de 6 patas, que tienen el tamaño aproximado de una semilla de sésamo.[4]
- No saltan ni vuelan; trepan muy rápido de una persona a otra a través del contacto cabeza con cabeza.[4]
- Los piojos no viven mucho tiempo fuera de la cabeza porque necesitan sangre para sobrevivir.[4]
- Los huevos de los piojos de la cabeza (liendres) tardan entre 8 y 9 días en incubarse.[4]
- El síntoma más frecuente de los piojos de la cabeza es la picazón del cuero cabelludo, pero solo las personas que son alérgicas a la saliva de los piojos de la cabeza la sienten.[4]
- No hay evidencia científica que indique que los remedios caseros funcionen.[5]



LOS PIOJOS DE LA CABEZA NO INFESTAN A LAS MASCOTAS, Y LAS MASCOTAS NO CONTAGIAN PIOJOS DE LA CABEZA.[4]

Referencias: 1. Datos en archivo. Arbor Pharmaceuticals, LLC. **2.** Loción Sklice [prospecto]. **3.** Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Sklice Lotion FDA approval letter. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2012/202736s000ltr.pdf. Consultada el 2 de agosto de 2016. **4.** Centers for Disease Control and Prevention. Frequently asked questions (FAQs). http://cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html. Consultada el 2 de agosto de 2016. **5.** Centers for Disease Control and Prevention. Treatment frequently asked questions. http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs_treat.html. Consultada el 2 de agosto de 2016. **6.** Centers for Disease Control and Prevention. Prevention & control. http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/prevent.html. Consultada el 2 de agosto de 2016.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LA LOCIÓN SKLICE

INDICACIÓN:

La loción Sklice® (ivermectin) al 0.5 % es un medicamento recetado para uso tópico en el cabello y el cuero cabelludo solamente, para el tratamiento de los piojos de la cabeza en personas a partir de los 6 meses de vida.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

La loción Sklice debe usarse en el contexto de un programa integral de manejo de los piojos:

- Lave (con agua caliente) o limpie a seco toda la ropa usada recientemente, los gorros, la ropa de cama usada y las toallas.
- Lave los artículos de cuidado personal, como peines, cepillos y hebillas con agua caliente.

Se puede usar un peine de dientes finos o un peine especial para liendres para retirar los piojos muertos y las liendres.

ANTES DE USAR LA LOCIÓN SKLICE, INFÓRMELE A SU MÉDICO SI USTED O SU HIJO:

- Tiene alguna sensibilidad o afección cutánea.
- Tiene cualquier otra afección médica.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si la loción Sklice puede causar daño al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si la loción Sklice pasa a la leche materna.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LA LOCIÓN SKLICE:

Para prevenir la ingesta accidental, se requiere la supervisión de un adulto para la aplicación pediátrica. Evite el contacto con los ojos.

Los efectos secundarios más frecuentes de la loción Sklice incluyen dolor o enrojecimiento ocular, irritación ocular, caspa, piel seca y sensación de ardor en la piel.

Informe a su médico si usted o su hijo tienen algún efecto secundario que les molesta o que no desaparece. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Para obtener más información, consulte la Información de Prescripción completa adjunta para la loción Sklice que se encuentra en la solapa posterior o visite www.Sklice.com.

Sklice® (ivermectin) Lotion, 0.5%

ES POSIBLE QUE NO PAGUE MÁS DE $30* POR LA LOCIÓN SKLICE

¡AQUÍ LE INDICAMOS CÓMO CANJEAR SU CUPÓN DE AHORRO DE SKLICE!

1. Obtenga una receta de la loción Sklice de su médico.

2. Solicite a su médico un cupón de ahorro de la loción Sklice, o descargue e imprima el cupón en línea en www.Sklice.com.

3. Entregue la receta y su cupón de ahorro de la loción Sklice a su farmacéutico.

*Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad. Arbor Pharmaceuticals se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin aviso. Fecha de vencimiento: 12/31/2018.

VISITE **WWW.SKLICE.COM** O CONSULTE EL REVERSO DE LA TARJETA DE AHORRO PARA VER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

arbor PHARMACEUTICALS, LLC

Sklice es una marca comercial registrada de Arbor Pharmaceuticals, LLC
©2017 Arbor Pharmaceuticals, LLC. Todos los derechos reservados.
Impreso en los EE. UU. Mayo de 2017. PP-SKL-US-0257